

野兎病の症状

急な発熱

悪寒

頭痛

筋肉痛

関節痛

乾咳

体力消耗

肺炎

肺炎を患った人は胸痛や血痰
などが生じ、呼吸困難や時には
完全呼吸停止になる恐れもあります。

野兎病に見られるその他の症状には、
皮膚や口腔の潰瘍、リンパ節の
膨れと痛み、目瞼の腫れと痛み、
そして喉の痛みがあります。

症状は細菌感染から通常3-5日後に
現れますが、潜伏期間が14日に
およぶこともあります。

詳しい情報は


Aloha United Way



www.hawaii.gov/doh

または

www.cdc.gov




ハワイ州保健局は人種、肌の色、国籍（言語を含む）、年齢、性別、信仰、および障害の有無にかかわらず、そのプログラムと活動を利用する権利をすべての人に提供します。

問題が起きた場合は、180日以内に書面もしくは電話にて差別撤廃措置担当者までご連絡ください。

Box 3378, Honolulu, HI 96801-3378 または
(808)586-4616（音声メールボックス）

野兎病

(Tularemia)



ハワイ州保健局

www.hawaii.gov/doh

お問い合わせやご相談は
2-1-1までお電話ください。

野兔病とは？

野兔病とは野兔病菌という細菌により引き起こされる感染症です。一般的に動物の病気であり、特にネズミやウサギへの感染が多く見られます。

感染経路は？

野兔病の感染経路は：

- 感染した動物の血を吸ったダニ、メクラアブ、蚊などによる虫刺され
- 感染した動物の死骸との接触
- 汚染された食物や水の摂取
- 空気中に散布された細菌の吸入野兔病は伝染病ではないために、人間から人間への感染はありません。



症状は？

野兔病の症状には以下のようなものがあげられます：

- 急な発熱
- 乾咳
- 悪寒
- 体力消耗
- 頭痛
- 肺炎
- 筋肉痛
- 関節痛

肺炎を患った人は胸痛や血痰などが生じ、呼吸困難や時には完全呼吸停止になる恐れもあります。

野兔病に見られるその他の症状には、皮膚や口腔の潰瘍、リンパ節の膨れと痛み、目瞼の腫れと痛み、そして喉の痛みがあります。

症状は細菌感染から通常3-5日後に現れますが、潜伏期間が14日におよぶこともあります。

治療方法は？

早期の治療であれば、医師の処方した抗生物質が効果的です。薬物治療の遅れは生存の確率を低下させる恐れがあります。



予防ワクチンがありますか？

過去に野兔病ワクチンは実験室の作業員を保護するためにのみ使用されていました。しかし、現在は食品医薬品局の審査中のために使用が許可されていません。

感染の発見方法は？

野兔病菌への感染は、血液や唾液の臨床検査によって確認できます。最もよく見られる感染原因としては、感染している動物との接触や、感染しているダニやハエによる虫刺されがあげられます。

感染後の対処方法は？

即座に治療を受けてください。また、医師に感染の可能性があることを伝えてください。適切な抗生物質による治療を施さないと、死に至る場合もあります。



発生場所は？

野兔病は動物に自然発生する病気です。アメリカ合衆国では毎年約200件の患者発生が報告されています。報告された感染の大半は農村地域で発生し、感染したダニやハエによる虫刺され、もしくは感染したネズミやウサギまたは野ウサギとの接触に起因しています。ハワイ州では、過去に一度



も動物および人間の野兔病発病は発見されていません。

なぜ野兔病菌が生物テロ兵器として警戒されているのですか？

野兔病菌は生存力が強く、非常に感染しやすいものです。凍結せず、また水の中で何週間も生存します。細菌は自然の広範囲にわたって発生しますが、検出し大量に増殖することも可能です。しかしながら、実用可能な細菌を噴霧する兵器の製造は非常に困難です。過去に野兔病菌はアメリカ合衆国と旧ソビエト連邦、また他の国家により生物兵器としての利用を目的に培養されていました。

ペットや他の動物が感染する可能性は？

はい、あります。野兔病は動物に見られる感染症です。中には感染した虫に刺されて発病する動物もいます。ご自分のペットや動物が感染したと思われる場合は、獣医までご連絡ください。



Hand lesion and deer mouse photos
courtesy Public Health Image Library,
Center for Disease Control and Prevention.