

病毒性出血熱的症狀

出血熱的症狀可在
受感染後4至21天內出現，
症狀包括：

發燒

疲勞

頭暈

斑疹

肌肉疼痛

無力

筋疲力竭

嚴重的病毒性出血熱病
例通常會出現皮下出血，內臟出血
以及從身體張口處，例如口，
眼和直腸處出血。

重病者還可能有休克，
昏迷，譫妄，中風和腎衰退的症狀。

如需了解更多詳情


Aloha United Way



www.hawaii.gov/doh

或

www.cdc.gov




衛生部向公眾提供各類項目與活動，
不分種族，膚色，國籍（包括語言），
年齡，性別，宗教或身體殘疾。

如果有歧視問題發生，請在180
天之內向我們的機會均等肯定行
動項目官員寫信，地址是
Box 3378, Honolulu, HI 96801-3378，
或者撥打電話
(808)586-4616（語音留言）

病毒性出血熱

(Viral Hemorrhagic Fever)



夏威夷衛生部
www.hawaii.gov/doh
詳細情況請電
2-1-1

什麼是病毒性出血熱？

病毒性出血熱(VHF)是由多種特征明顯的病毒所引起的一組疾病，大多數這些病毒可以導致嚴重致命的疾病。這些疾病被稱作“出血性”是因為它們與

出血有關。



與大多數VHF有關的病毒自然發現于動物，壁虱和蚊子。病毒完全依賴于這些

“宿主”而生存。

病毒性出血熱(VHF)是怎樣傳播的？

引起出血熱的病毒，通過以下途徑最初傳播到人：

- 人類接觸受到感染的臼齒類動物的尿液，糞便，唾液或者其它體液。



- 受染蚊子或壁虱叮咬人。

- 另外，其中的一些載體會將病毒傳播到其它動物，如家畜身上。然後，當人飼養或宰殺動物時，便會受到傳染。

一些導致病毒性出血熱的病毒，一旦初始人受到感染，便會傳染到他人。這種病毒的二度傳染會通過與受染人或其體液相接觸而直接發生，也會通過接觸受染體液注射針等物品而間接發生。

對於由人而傳染的病毒性出血熱，控制其傳播的最好方法是避免與受染病人及其體液近距離接觸。

病毒性出血熱有哪些症狀？

出血熱的症狀可在受感染後4至21天內出現，症狀包括：

- 發燒
- 疲勞
- 頭暈
- 斑疹
- 肌肉疼痛
- 無力
- 筋疲力竭

嚴重的病毒性出血熱病例通常會出現皮下出血，內臟出血以及從身體張口處，例如口，眼和直腸處出血。



重病者還可能有休克，昏迷，譫妄，中風和腎衰退的症狀。

怎樣治療病毒性出血熱？

病人住院接受輔助療理。對病毒性出血熱沒有特別的治療方法。



您怎樣知道是否有可能受到傳染？

只有在有可能受到傳染後4至21天，症狀出現後，您才會知道已經到了傳染。

診斷是根據症狀和疾病類型而進行的。通過血液和組織檢測來確診通常需要數天時間。

如果您可能受到出血熱傳染應當怎麼辦？



及時尋求醫療幫助。告訴您的醫生您有可能受到傳染。如果您已染病，應當儘量減少與他人接觸。通過查看是否有發燒和斑疹症狀來監視您的健康狀況。

病毒性出血熱發現于什麼地方？

導致病毒性出血熱的病毒在世界大部份地區都可以發現。但是，由於每一種病毒是與一個或多個特定的動物宿主相關，此病毒及疾病也通常只有在宿主生存的地方可以發現到。由於每年旅遊人數增多，在以前從未發生過這一疾病的地方，此病暴發的可能性也愈加具有威脅性。

為什麼人們擔心病毒性出血熱會被用作生物武器？

某些VHF種類很具傳染性，病死率高，大多數的病都無特別療法。受傳染後，病症有可能在長達21天之後才出現，使得疾病在廣大的地理範圍內傳播開來。

寵物和其它動物會得病毒性出血熱嗎？

是的，動物也會得病毒性出血熱。如果您認為您的寵物受到了傳染，請及時向獸醫詢問。某些VHF病毒可以由壁虱，跳蚤和蚊子從動物傳染到人。

