

หลังเกิดพายุ: โรคพยาธิปอดหนู



สำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

Neuroangiostrongyliasis หรือที่เรียกว่าโรคพยาธิปอดหนูส่งผลกระทบต่อสมองและไขสันหลัง เกิดจากปรสิตที่พบในหนู ทาก และหอยทาก โรคนี้สามารถพบได้ในทุกเกาะในฮาวาย อาการมีตั้งแต่ปวดศีรษะอย่างรุนแรงไปจนถึงภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น คอแข็งหรือแขนขาอ่อนแรง

สิ่งที่ควรทราบ:



- หนูที่ติดเชื้อมีแนวโน้มจะส่งต่อปรสิตผ่านในมูล
- ทากและหอยทากจะติดเชื้อจากการกินมูลของหนู
- ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นทำให้มีหอยทากและทากเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อโรคมามากขึ้นเช่นกัน
- ผู้คนสามารถล้มป่วยได้จากการกินวัตถุดิบที่ไม่ได้ล้าง ซึ่งมีหอยทากหรือทากตัวเล็กๆ เกาะอยู่

สิ่งที่ต้องทำ:



- ล้างผลผลิตให้สะอาดผ่านน้ำไหล แม้จะมีป้ายกำกับว่า "ผ่านการล้างแล้ว" และให้ตรวจดูส่วนใบสีเขียวเพื่อหาทาก/หอยทากตัวเล็กๆ
- รักษาสุขอนามัยของมือให้ดี โดยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หลังจากหยิบจับวัตถุดิบหรือทำสวน
- กำจัดแหล่งอาหารด้วยการปิดฝาถังขยะ ทำความสะอาดผลไม้ที่ร่วงหล่น และกำจัดแหล่งอาหารอื่นๆ ที่อาจดึงดูดหนู
- กำจัดน้ำนิ่งด้วยการเทน้ำในภาชนะ กระถาง ต้นไม้ หรือผ้าใบกันน้ำหลังพายุให้แห้งสนิท
- ควบคุมและกำจัดศัตรูพืชด้วยการกำจัดทาก หอยทาก และหนูบริเวณบ้านและสวน โดยใช้เหยื่อ กับดัก อุปกรณ์ป้องกันหนู และการมีสุขอนามัยที่ดี ไข่ที่คืบหรือตะเกียบหอยทากหรือทากลงใน "เหยื่อทาก" ที่ใส่น้ำ 6 ส่วนต่อเกลือ 1 ส่วน



การตรวจจับและการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งสำคัญ
ไปพบแพทย์ทันที
หากคุณสงสัยว่าคุณติดเชื้อ

สแกนเพื่อไปยังเว็บไซต์โรคพยาธิปอดหนู
DOH



โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดจากหน่วยงานท้องถิ่น

โรคพยาธิปอดหนู | อัปเดตเมื่อ 26 มีนาคม 2026

Rat Lungworm (Thai)